



365  
-4  
---  
361

## That's 361 days to focus on life... not psoriasis

For the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adult patients (18 years or older) who have failed to, or have contraindication to, or are intolerant to other systemic therapies including ciclosporin, methotrexat and psoralan U.V (PUVA).

Introducing the first in a new class of biologics which selectively targets IL-12 and IL-23

### Stelara® offers: Efficacy

- Over two-thirds of patients achieved PASI 75 by Week 12 after only two doses<sup>1,2</sup>
- Stelara provides superior efficacy over high dose Etanercept with similar safety over a 12 week period<sup>3</sup>

### Convenience

- Four doses per year, after 2 induction doses<sup>4</sup>

### Confidence

- Safety has been established in a large clinical development programme - 3 years analysis of 4,728 patient-years<sup>5</sup>

References: 1. Papp KA, et al. Lancet. 2008;371:1675-84. 2. Leonardi CL, et al. Lancet. 2008;371:1665-74. 3. Griffiths C, et al. NEJM 2010;362:118-284. 4. Stelara® SPC. Available from: <http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/stelara/H-958-Pl-en.pdf>. Accessed 11 Feb 2009. 5. Gordon k, et al. poster at EADV 2009.



For comprehensive information please refer to full prescribing information as approved by the Israeli health Authority

A Division of J-C Health Care Ltd.  
קבוצת שטיים 60990, טל. 03-9591111, פקס. 03-9583636

## חברת JANSSEN שמחה לבשר על הכללת התרופה סטלרה בסל הבריאות לשנת 2011 כטיפול ביולוגי בפסוריאזיס (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של התכשירים הביולוגים לפסוריאזיס)

בהתייחס לחולה העונה על האמור בפסקת משנה (א)(2)- החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול

ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה בדרמטולוגיה

- סטלרה זמינה בכל קופות החולים
- סטלרה מאוחסנת בקירור 2-8 מעלות

א. הטיפול בסטלרה יינתן לטיפול בפסוריאזיס בהתקיים כל התנאים האלה:

1. החולה סובל מאחד מאלה:
  - א. מחלה ממושטת מעל ל-50% של שטח גוף או PASI מעל ל-50
  - ב. נגעים באזורי גוף רגישים-אזורים אלו יכללו פנים, צוואר, קיפולי עור, כפות ידיים, כפות רגליים, אזור הגניטליה והישבן
2. החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור של 50% לפחות ב- PASI לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול;